




Spargel Erzeugerring Südbayern e.V., Tal 35, 80331 München
 Tel.Nr. 089 / 290063 - 16 / Fax.Nr. 089 / 290063 - 20
 e-mail: hans.mooser@lkp.bayern.de

München, 29.03.2010

Rundschreiben

Pflanzenschutzmittel in Spargel



Schadursache	Mittel	Anwendung	Zulassung	WZ	Anwendung g	Bemerkung
Ungräser Unkräuter/	Fusilade Max	1,00-2,00l/ha	§18a	F	max. 1x	Gegen einjährige einkeimblättrige Unkräuter, außer einjähriges Rispengras höhere Aufwandmenge bei Quecke
	Select 240 EC + Para Sommer Öl	0,75 l/ha	§18a	F	max. 1x	Gegen einjähriges Rispengras und einjährige einkeimblättrige Unkräuter. Ab Pflanzjahr nach der Stechperiode als Unterblattbehandlung in Mischung mit Para Sommer Öl.
	Aramo	2,00 kg/ha	§18a	F	max. 1x	nach der Stechperiode, auch gegen Quecke, nach dem Auflaufen der Ungräser, Junganlagen nach Pflanzung
	Roundup Ultra Max	8,00 l/ha	§18a	F	max. 1x	Gegen Ackerwinde, ein- und zweikeimblättrige Unkräuter. Anwendung während der Vegetationsperiode ausgenommen der Stechperiode. Als Zwischenreihenbehandlung mit Abschirmung bzw. Streichbehandlung
	Lentagran WP	2,00 kg/ha		F	max. 1x	Gegen zweikeimblättrige Samenunkräuter. Anwendung vor dem Stechen oder nach dem Stechen als Unterblattspritzung in Ertragsanlagen
	Basta	3,00 l/ha		F	max. 1x	nach dem Aufrichten der Dämme, vor dem Stechen; Gegen aus Samen auflaufende ein- und zweikeimblättrige Unkräuter.
	Sencor WG	0,75 kg/ha		F/ 7 Tg.	max. 1x	In Junganlagen, Anwendung im Pflanzjahr, 7 - 10 Tage nach dem Pflanzen, vor dem Durchstoßen. In Ertragsanlagen Anwendung nach dem Aufrichten der Dämme, vor der Stechperiode.

Stomp Aqua	3,50 l/ha			21 Tg.	max. 1x	Anwendung vor dem Stechen gegen einjährige zweikeimblättrige Unkräuter. Es darf nur eine Anwendung je Fläche und Jahr erfolgen, entweder vor oder nach der Stechperiode. als Unterblattbehandlung in Ertragsanlagen; Schäden an austreibenden Sprossen sind möglich
Buctril; Curol B	1,50 l/ha	§18a	F		max. 1x	nach der Stechperiode bzw. Einebnen der Dämme und vor dem Durchstoßen des Spargels. Gegen Hühnerhirse, einjähriges Rispengras und einjährige zweikeimblättrige Samenunkräuter. <i>Zulassung abgelassen, Restmengen sind bis zum 31.12.2011 einsetzbar.</i>
Centium 36 CS	0,25 l/ha	§18a	F		max. 1x	nach der Stechperiode bzw. Einebnen der Dämme bis nach dem Durchstoßen des Spargels; im Pflanzjahr bis nach dem Durchstoßen der Triebe
Spectrum	1,40 l/ha	§18a	F		max. 1x	Anwendung nach dem Stechen vor dem Austrieb; in Junganlagen 7-10 Tage nach dem Pflanzen; höhere Aufwandmenge bei mittleren bis schweren Böden
Artist	2 bis 2,5 kg/ha	§18a	F		max. 1x	vor dem Austrieb nach der Stechperiode; in Junganlagen nach dem Pflanzen, vor dem Austrieb
in Junganlagen	0,25 l/ha				max. 2x	
Touchdown	5,00 l/ha	§18a	F		max. 1x	nach der Stechperiode. Spritzen ab Keimblattstadium der Unkräuter als Unterblattbehandlung.
Quatro, Herburan GL						
Buctril	1,5 l/ha	§ 18a	F		max. 1x	
Polyram WG	1,20 kg/ha		F		max. 4x	bei Befallsbeginn in Ertrags- und Junganlagen
Funguran	3,30 kg/ha	§ 18b	7 Tg.			keine Zulassung für Rost – Aufbrauchfrist/ Antrag auf § 18 b
Dithane Ultra WP	1,20 kg/ha		F		max. 4x	bei Befallsbeginn in Ertrags- und Junganlagen nach der Ernte: <i>Zulassung abgelassen, Restmengen sind bis 31.12.2010 einsetzbar.</i>
Score	0,40 l/ha		F		max. 3x	<i>Zulassung läuft am 31.03.2010 ab, Restmengen sind noch 2 Jahre einsetzbar.</i>
Folicur	1,50 l/ha		F		max. 2x	<i>Zulassung läuft am 31.03.2010 ab, Restmengen sind noch einsetzbar.</i>
Opus	1,00 l /ha	§18a	F		max. 2x	bei Befallsbeginn in Ertrags- und Junganlagen
Amistar opti	2,50 l/ha	§18a	F		max. 2x	Anwendung bei Befallsbeginn, im Abstand von 10 – 14 Tagen
Ortiva	1,00 l/ha		F		max. 2x	bei Befallsbeginn in Ertrags- und Junganlagen, nach dem Stechen, im Abstand von 8 – 12 Tagen
Spargelrost . Stemphylium						

	Discus, Strobly WG	0,50 kg/ha	§18a	F	max. 3x	bei Befallsbeginn in Ertrags- und Junganlagen, im Abstand von 14 – 21 Tagen
Botrytis	Switch	1,00 kg/ha	§18a	F	max. 3x	bei Befallsbeginn in Ertrags- und Junganlagen, im Abstand von 10 – 14 Tagen
	Amistar opti	2,50 l/ha	§18a	F	max. 2x	nach dem Austrieb, bei Befallsbeginn, im Abstand von 10 – 14 Tagen
Spargelfliege	Signum	1,50 kg/ha	§18a	F	max. 2x	bei Befallsbeginn, im Abstand von 14 – 21 Tagen.
	Perfekthion, Rogor 40L, Danadim Progress,	0,60 l/ha		F	max. 5x	in Junganlagen nach dem Austrieb bzw. in Ertragsanlagen nach dem Stechen bis Ende Juni, bei Befallsbeginn, im Abstand von 8 – 10 Tagen.
	Neem Azal	1,50 l/ha	§ 18 a	F	max. 2x	Anwendung bei Befallsbeginn im Abstand von 10 – 14 Tagen. In Junganlagen und Ertragsanlagen nach der Ernte.
	Trafo WG	0,15 kg/ha	§18a	F	max. 1x	bei Befallsbeginn, in Ertragsanlagen nach der Ernte.
Saugende und beißende Insekten	Karate mit Zeon Technologie	0,075 l/ha	§18a	F	max. 1x	in Ertragsanlagen nach der Ernte, und Junganlagen, bei Befallsbeginn.
	Talstar 8 SC	125ml/ha	§18a	F	max. 2x	in Ertragsanlagen nach der Ernte, und Junganlagen
	Fastac SC Super Contact	125 ml/ha	§18a	F	max. 1x	in Ertragsanlagen nach der Ernte, und Junganlagen
	Spruzit Neu	6,00 l/ha	§18a	3 Tg.	max. 2x	bei Befallsbeginn
	Neudosan Neu	18,0-27,0 l/ha	§18a	F	max. 5x	bei Befallsbeginn
Raupen	Xen Tari	0,6- 1,0 kg/ha	§18a	F	max. 5x	gegen freifressende Schmetterlingsraupen im Larvenstadium. In Ertragsanlagen nach der Ernte. Höhere Aufwandmenge gegen Eulenarten im Larvenstadium. Im Abstand von 5 – 7 Tagen spritzen.
	Calypso	0,2 l/ha	§ 18a	F	max. 2x	bei Befallsbeginn, im Abstand von 10 – 14 Tagen. In Junganlagen und Ertragsanlagen nach dem Stechen

Gegen Wurzelfliegen stehen derzeit keine ausgewiesenen Insektizide zur Verfügung. In Junganlagen können die gegen Spargelfliegen einsetzbaren Dimethoate verwendet werden, in Ertragsanlagen sollten Befallsflächen mit Folien bedeckt werden.

Die hier gemachten Angaben ersetzen in keinem Fall die Gebrauchsanleitung. Die jeweilig geltenden Auflagen sind der Gebrauchsanweisung zu entnehmen. Eine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben sowie eine Haftung für Irrtümer oder Nachteile, die sich aus der Empfehlung ergeben könnten, wird nicht übernommen.